


麝的鼠咬伤防治



李 光 莹

(四川省马尔康养獐试验场)

老鼠不但偷吃饲料，咬毁用具，而且传播多种疾病。家畜被老鼠咬伤，并不是什么新鲜事，而老鼠对麝的伤害还未见报道。

我场近年来，已发现有麝的鼠害。去冬今春，本场已有三头成年林麝(1头 2头)被老鼠咬伤，经过救治，痊愈2头(1头 1头)死亡1头()。

受害时间：开初，麝被咬伤后，原因不明，众说纷纭。经过观察，是老鼠咬伤。多在拂晓时候进行。老鼠爬在麝的身上咬食，麝并无明显的反抗表示。有时咬痛了，便走几步，老鼠发现人或人的动作声响，立刻逃跑。

受害部位：颈部、背部、肩胛等处，尤以颈部为多见。

临床症状：一般是皮肤及皮下组织受到伤害。有的伤口重复被害，深层组织也受到损害。范围1—4厘米，成不规则

的圆形。边缘不整齐，凹下。伤口出血，呈暗红色，有的被感染。下雨天，伤口凹下里，集有雨水。个别严重病例，长期不愈，露出颈椎骨。病麝精神、食欲减退，活动受阻。

防治措施：首先考虑调离病麝，其次才考虑治疗。

病麝调离受伤地点(单圈或大圈)于20米以外的单圈或大圈中去饲养，必要时还将调到100米以外的另一栋圈去饲养。避免再次受伤，以便观察治疗。

隔离后的病麝积极进行治疗。伤口作外科处理，先用0.1%的高锰酸钾溶液反复清洗伤口，干后以75%的乙醇消毒，撒布消炎粉或消炎油膏涂搽，纱布块复盖。并以抗菌素或磺胺类药物给予全身治疗。

自古以来，我国人民消灭老鼠已有相当长的历史，所以“老鼠过街，人人喊打”由来已久了。除害灭鼠工作，也是减少麝群疾病的措施之一。

我们常用的机械灭鼠如：打鼠板，鼠夹，鼠笼等方法，简便易行，安全可靠，效果满意。

药物灭鼠，以1:25—50的磷化锌；1:4的安妥，用大米或玉米粉作诱饵，取食率可达80%左右。专人负责，效果好。