

中。1982年7月4日，尚可见到白头鹎衔草营巢。

表 白头鹎繁殖情况统计

发现日期	营巢环境及树种	离地面(米)	巢的量度(厘米)				营巢材料	卵数
			高	外径	内径	深		
82.4.29	居民庭院内；桃树。	1.9	14.4	11.6	7.9	6.	草茎、棉线、草叶。	4
82.5.1	河堤的迎水坡灌丛中；野蔷薇	0.76	13.4	10.4	7.5	5.7	草茎、草根、茧丝、猪毛。	4
82.5.6	本校校园内；香椽丛中。	1.8	15.6	12.6	10.3	6.4	废纸、草茎、尼龙丝带、草叶。	5
82.5.6	居民庭院中；月季花丛中。	1.3	12.3	8.5	7.5	6.2	草茎、草叶、塑料薄膜、茧丝。	3
82.5.7	居民住宅旁的菜地；梨树。	2.7	14.5	12.5	9	6.3	草茎、竹叶、草根、毛发。	4
82.5.9	居民屋后；桃树。	2.4	14.1	9.4	8.1	5.9	草茎、草叶、草根、茧丝。	5
82.5.9	居民房屋门前；刺槐。	6.2	15.7	13.3	9	6.4	草茎、草根、棉絮、草叶、茧丝、羽毛。	7
82.5.10	居民庭院中；桃树。	1.5	14.3	10.3	7.8	6.1	稻草、细根、茧丝、羽毛。	4
82.5.17	瘦西湖公园中；南天竹。	0.85	12.5	8.6	7.5	6.2	草茎、细根、茧丝、糖纸。	3
83.4.27	居民屋后竹园中；竹。	5.3	14.3	11.5	8.3	6.4	竹叶、草茎、细根、茧丝、尼龙丝。	6
83.5.1	居民庭院内；梨树。	2.9	13.8	10.1	7.4	6.3	稻草茎叶、羽毛、茧丝。	4
83.5.4	居民住宅旁菜地；桃树。	2.6	12.7	10.5	7.6	6.1	草茎、细棕绳、草叶、废纸。	4
83.5.8	河堤上；刺槐。	2.7	15.4	12.7	9	6.4	草茎、细根	5

四川鸟类新纪录*

余志伟 邓其祥 李建国

(南充师范学院生物系)

1983—1984年，在渡口地区考察，发现两种鸟是四川鸟类新纪录：

1. 绿喉蜂虎 *Merops orientalis ferrugiceps* Anderson

1984年4月4日采于米易县小得石(海拔1100米)。

2. ，体重22克(以下重量单位同)，体长223、253毫米(以下长度单位同)，翼长93、94，嘴峰22、24，跗蹠11、12，尾长111、141。

该鸟中央尾羽特别延长，头顶至上背锈色沾绿，上体余部绿色，下体除前胸具黑色横带外，概为草绿色，喉部绿色沾蓝。

喜单个或结成小群，活动于疏林草坡。在当地为夏候鸟。

2. 灰背鸫 *Turdus hortulorum* Sclater

1984年3月30日采于米易县小得石(海拔1040米)。

1. ，体重66，体长218，翼长119，嘴峰22，跗蹠31，尾长86。

该鸟上体蓝灰色沾棕，喉白色，上胸灰色，具黑色斑点，下胸、体侧栗色，腹部白色。常结群活动于森林或灌丛，在当地为冬候鸟。

至此，四川省鸟类已达583种。

*承中科院动物所郑作新教授帮助鉴定。我院蒲世全同志参加野外采集。