

邵阳地区优势种。4—6月繁殖。

15、**花臭蛙** *Rana schmackeri* 1986年10月丹口1、1987年9月蕲溪1。常静息在山溪水边石块上。

16、**虎纹蛙** *Rana rugulosa* 1983年4月七里坪1、1985年10月黄龙2、1986年9月丹口2、1987年10月蕲溪2 1。每年10月后入洞蛰伏。

17、**华南湍蛙** *Amolops ricketti* 1986年10月丹口1、1984年6月黄桑1。栖于高山溪流中。

18、**大树蛙** *Polypedates dennysi* 1983年6月云山1、1985年10月紫云山1、1987年10月蕲溪1、1985年6月武冈1。5—6月繁殖。

19、**斑腿树蛙** *Polypedates leucomystax* 1984年6月云山1、1985年10月紫云山1、1985年6月黄桑1、1987年10月蕲溪1。5—6月繁殖。

20、**饰纹姬蛙** *Microhyla ornata* 1983年5月七里坪1、1985年10月紫云山1、1987年10月洞口1、1987年10月蕲溪1。6—8月繁殖。

21、**粗皮姬蛙** *Microhyla butleri* 1983年5月七里坪1、1985年10月紫云山2、1987年10月洞口1、1987年10月蕲溪1。常和饰纹姬蛙混杂。

22、**花姬蛙** *Microhyla pulchra* 1983年5月七里坪1、1985年9月紫云山1、1987年10月洞口1 2。分布广泛。

23、**小弧斑姬蛙** *Microhyla heymonsi* 1983年5月七里坪1、1986年10月城步1、1985年10月紫云山2。喜栖稀疏草丛。

以上23种中，大鲵、中华蟾蜍、黑斑蛙为广布于古北界东洋界的种类，余为东洋界的种类，故邵阳地区在动物区系上属东洋界无疑。小角蟾、瑶山髭蟾、棘腹蛙、日本林蛙、阔褶蛙、龙胜臭蛙、花臭蛙、大树蛙、斑腿树蛙、三港雨蛙为华中区的种类，其余十种则为广布于华南区和华中区的种类，因此本地区的动物区系应属华中区。

四川省首次发现大仓鼠

郭延蜀

胡锦涛

色科

任树培

(南充师范学院地理系)

(南充师范学院生物系)

(铁布自然保护区)

在整理四川省若尔盖铁布自然保护区的兽类标本时，发现大仓鼠 *Cricetulus triton canus*，系1987年5月7日采于若尔盖铁布自然保护区冻烈公社附近(2550m)。1，体重83克，体长144毫米(下同)，尾长104，后足长22，耳长21，颅全长35.5，腭长18.9，颧宽18.1，后头宽15，上齿列6.3，下齿列6.8。

特征：具颊囊，体长超过140，尾毛蓬松，尾长达体长的三分之二。

生物学资料：采集于河边灌丛下，解剖发现为孕鼠，子宫内有八个胚胎；颊囊内有少量沙石；胃内全是杂草嫩叶。