

温度和光周期对虎斑蝶幼期生长发育的影响

陈祯¹, 周成理^{2*}, 陈晓鸣², 石雷²

(1. 玉溪师范学院化学生物与环境学院, 云南玉溪 653100; 2. 中国林业科学研究院资源昆虫研究所, 昆明 650224)

摘要: 通过在人工气候箱内设定温度和光周期梯度单虫饲养观察个体发育史, 研究了温度和光周期对虎斑蝶 *Danaus genutia* 幼期生长发育的影响, 研究结果可为该高观赏价值蝶种的规模化养殖提供依据。结果显示: 在长光照(LD = 15:9)条件下, 温度 17.5 °C、20.0 °C、22.5 °C、25.0 °C、27.5 °C、30.0 °C 时虎斑蝶卵的平均发育历期分别为 9.29 d、4.90 d、4.91 d、3.97 d、3.54 d、3.20 d, 幼虫的分别为 38.04 d、17.89 d、17.13 d、10.82 d、9.92 d、10.20 d, 蛹的分别为 22.71 d、13.72 d、12.00 d、7.73 d、7.46 d、6.80 d; 在短光照(LD = 9:15)条件下, 温度 17.5 °C、20.0 °C、25.0 °C、30.0 °C 时虎斑蝶卵的平均发育历期分别为 9.04 d、8.20 d、4.11 d、3.04 d, 幼虫的分别为 30.08 d、18.54 d、13.29 d、9.54 d, 蛹的分别为 21.19 d、13.40 d、9.64 d、6.38 d。虎斑蝶卵的发育起点温度和有效积温最小, 分别为 11.10 °C 和 55.15 d · °C; 其次是蛹, 分别为 13.46 °C 和 98.95 d · °C; 幼虫最大, 分别为 14.06 °C 和 131.62 d · °C。结果表明: 温度是影响虎斑蝶幼期发育速率的主导因素, 光照与幼期各虫态的发育历期相关性均不显著。在养殖生产上, 建议将幼期养殖温度控制在 20.0 ~ 27.5 °C, 光照并非养殖生产中需要重点管理的条件, 采用自然光照即可。

关键词: 虎斑蝶; 发育历期; 发育起点温度; 有效积温; 人工繁育

中图分类号: Q969 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-7083(2018)04-0420-06

Effects of Temperature and Photoperiod on the Development of Immature Stages of *Danaus genutia*

CHEN Zhen¹, ZHOU Chengli^{2*}, CHEN Xiaoming², SHI Lei²

(1. School of Chemical Biology and Environment, Yuxi Normal University, Yuxi, Yunnan Province 653100, China;

2. Research Institute of Resource Insects, Chinese Academy of Forestry, Kunming 650224, China)

Abstract: To investigate the effects of temperature and photoperiod on the development of immature stages of the common tiger butterfly (*Danaus genutia*), which was collected from Yuanjiang county, Yunnan province. The life-cycle stages and developmental durations of each stage of *D. genutia* were observed by individually rearing eggs, larvae and pupae under different temperatures and photoperiods in climatic chambers. Developmental threshold temperatures (C) and effective accumulated temperatures (K) of eggs, larvae and pupae were measured. In long-day treatment (LD = 15:9) and at different temperatures (17.5 °C, 20.0 °C, 22.5 °C, 25.0 °C, 27.5 °C, 30.0 °C), the durations of egg stage were 9.29 days, 4.90 days, 4.91 days, 3.97 days, 3.54 days, and 3.20 days, respectively; The durations of larva stage were 38.04 days, 17.89 days, 17.13 days, 10.82 days, 9.92 days, and 10.20 days, respectively; The durations of pupa stage were 22.71 days, 13.72 days, 12.00 days, 7.73 days, 7.46 days, and 6.80 days, respectively. In short-day treatment (LD = 9:15) and at different temperatures (17.5 °C, 20.0 °C, 25.0 °C, 30.0 °C), the durations of egg stage were 9.04 days, 8.20 days, 4.11 days, and 3.04 days, respectively; The durations of larva stage were 30.08 days, 18.54 days, 13.29 days, and 9.54 days, respectively; The durations of pupa stage were 21.19 days, 13.40 days, 9.64 days, and

收稿日期: 2017-11-28 接受日期: 2018-04-20

基金项目: 中国林业科学研究院中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目(CAFYBB2017MB215)

作者简介: 陈祯(1983—), 男, 博士, 主要从事昆虫生态学、资源昆虫以及害虫综合治理研究, E-mail: cz@ynu.edu.net

*通信作者 Corresponding author, E-mail: buttzhou@163.com

6.38 days, respectively. The results showed that in terms of $T = C + KV$, C and K of eggs, larvae and pupae were determined as follows: $T_{\text{egg}} = 11.10 + 55.15V$, $T_{\text{larva}} = 14.06 + 131.62V$, and $T_{\text{pupa}} = 13.46 + 98.95V$. These results suggested that temperature has more significant influence on the growth and development of immature stages of *D. genutia* compared with photoperiods, and thus temperature is a key factor in determining the developmental velocity of immature stages of *D. genutia*. In contrast, no significant differences were observed in the developmental duration of immature stages of the butterfly between the long-day treatment (LD = 15:9) and the short-day treatment (LD = 9:15). We suggest that the appropriate rearing temperatures of immature stages of *D. genutia* should be controlled in the range of 20.0 – 27.5 °C. Furthermore, natural light can satisfy the needs of the development of immature stages of the butterfly.

Keywords: *Danaus genutia*; developmental duration; developmental threshold temperatures; effective accumulated temperatures; artificial breeding

虎斑蝶 *Danaus genutia* 隶属蛱蝶科 Nymphalidae 斑蝶亚科 Danainae 斑蝶属 *Danaus*, 又名粗脉棕斑蝶、黑脉桦斑蝶、拟阿檀蝶、虎纹青斑蝶和青红条红斑蝶等。国内分布于河南、四川、云南、西藏、江西、浙江、福建、广东、广西、台湾和海南等地,国外分布于中南半岛、西太平洋诸岛和澳大利亚(周尧, 1998)。成虫中大体型,访花,翅膀正面色彩鲜艳,飞行缓慢,姿态优美,是生态观赏、喜庆放飞和工艺制作的优良蝶种,无危害经济和园林植物记录。该种蝴蝶在国内蝴蝶观赏园及庆典蝴蝶放飞中被广泛利用,但其主要生物学、生理生态学特征等鲜见报道。在国内,陈晓鸣等(2008)首次对虎斑蝶的主要寄主、幼期形态特征及成虫和幼虫习性进行了初步记述;陈祯等(2017)对云南元江虎斑蝶种群的全虫期形态特征、幼期发育历期、在云南昆明温室中的代生活史和生殖力、寄主范围、成虫及幼虫的行为习性进行了详细报道。在国外,Meyer(1995)简略描述了澳大利亚虎斑蝶 *D. genutia alexis* 的1龄、5龄幼虫及蛹的形态,幼虫期和蛹期在自然条件下的发育历期; Bhuyan 等(1999)研究了虎斑蝶成虫对4种蜜源植物的选择性; Atluri 等(2010)报道了印度 Visakhapatnam 地区虎斑蝶的幼期形态、幼期发育历期及幼虫取食寄主植物 *Pergularia daemia* 后的生长发育情况;此外,学者也对虎斑蝶的寄主植物进行了报道(Meyer, 1995; Igarashi & Fukuda, 2000; Robinson et al., 2001; Atluri et al., 2010)。

近10多年来,野生虎斑蝶因美丽的颜色斑纹及轻缓的飞行方式被大量采集,用于商业放飞和工艺品制作,野生种群数量急剧下降,野生资源在数量和

质量上都无法满足国内迅猛发展的市场需要,开展人工繁育势在必行。为此,本文作者近年来对云南省元江县虎斑蝶的主要生物学、生理生态学特征进行了较为系统的持续研究,以期筛选出优良寄主植物,找出最佳幼期发育条件和成虫繁殖条件,研发出高效的规模化人工繁育技术。本文报道温度和光周期对虎斑蝶幼期生长发育的影响。

1 材料与方法

1.1 实验材料

虎斑蝶:成虫种源采自云南省元江县野外,将采回的野生雌雄成虫置于云南省昆明市盘龙区中国林业科学研究院资源昆虫研究所蝴蝶试验大棚内放养,建立实验种群。采集新产的卵供实验用。

饲养幼虫的寄主植物:青羊参 *Cynanchum otophyllum*(萝藦科 Asclepiadaceae)。

成虫补充营养:10%蜂糖水。

1.2 实验方法

1.2.1 温度和光周期对虎斑蝶幼期生长发育的影响 在人工气候箱(型号:SPX-400;上海博讯医疗设备厂)内设置2个光照处理[长光照(LD = 15:9)和短光照(LD = 9:15),依据 Goehring 和 Oberhauser (2002)对虎斑蝶近缘种君主斑蝶 *Danaus plexippus* 相关研究中的光周期,并结合元江冬、夏季最短和最长光照时数考虑]。长光照下设7个温度梯度:17.5 °C、20.0 °C、22.5 °C、25.0 °C、27.5 °C、30.0 °C 和 35.0 °C;短光照下设5个温度梯度:17.5 °C、20.0 °C、25.0 °C、30.0 °C 和 35.0 °C。以上处理组的湿度均恒定为70%。

由于卵的孵化率和初龄幼虫成活率存在差异,各处理中使用不同初始卵量以保证每个处理中至少有 60 头幼虫存活至 2 龄初。故每个处理自 80~150 粒新产卵开始,幼虫孵化后以保鲜枝叶单虫饲养,直至化蛹、羽化。1~3 龄期每 2 日更换 1 次食料,此后每日更换食料。每日记录卵孵化数、幼虫蜕皮数、化蛹数、羽化数,计算各虫态发育历期。

1.2.2 幼期各虫态发育起点温度和有效积温 测定长光照下幼期各虫态发育起点温度(C)和有效积温(K),设置了 17.5 °C、20.0 °C、22.5 °C、25.0 °C、27.5 °C、30.0 °C 6 个恒定温度梯度,根据公式 $T = C + KV$,式中, T 为温度, V 为各温度下的发育速率,采用“直线回归法”计算虎斑蝶各个虫态的发育起点温度与有效积温(张孝义,2011)。

1.3 数据分析

利用 SPSS 19.0 对数据进行方差分析,平均数进行 Duncan's 检验,显著性水平 $\alpha = 0.05$;多元相关分析采用偏相关分析。

2 结果

2.1 温度和光周期对卵发育历期的影响

不同温度条件下,长光照组虎斑蝶卵的发育历期为 2~11 d,短光照组为 2~10 d(表 1)。在相同光照和设定温度范围内,随着温度上升,卵的发育加快,发育历期缩短。无论是在长光照还是短光照条件下,同一温度条件下实验卵的发育均较为整齐。在长、短光照处理中,当温度设定为 35 °C 时,卵均不能孵化。偏相关分析表明,在固定温度条件下,光照与卵的发育历期呈不显著正相关($R^2 = 0.376$, $P = 0.406$);在固定光照条件下,温度与卵的发育历期呈极显著负相关($R^2 = -0.950$, $P = 0.005$)。

2.2 温度和光周期对幼虫发育历期的影响

不同温度条件下,长光照组虎斑蝶幼虫的发育历期为 9~50 d,短光照组为 8~40 d(表 2)。在相同光照和设定温度范围内,随着温度上升,幼虫的生长发育加快,发育历期缩短。无论是在长光照还是短光照条件下,同一温度下幼虫不同龄期的发育历期为:5 龄 > 1 龄 > 4 龄 > 2 龄和 3 龄。偏相关分析表明,在固定温度条件下,光照与幼虫的发育历期呈

表 1 不同温度和光周期下虎斑蝶卵的发育历期
Table 1 Developmental durations of the egg of *Danaus genutia* under different temperatures and photoperiods

光周期 Photoperiod	温度 Temperature/°C	发育历期 Developmental duration/d	样本量 Sample size/粒
长光照 (15:9)	17.5	9.29 ± 1.12 ^a	113
	20.0	4.90 ± 0.90 ^b	120
	22.5	4.91 ± 0.29 ^b	93
	25.0	3.97 ± 0.17 ^c	100
	27.5	3.54 ± 0.83 ^d	146
	30.0	3.20 ± 0.41 ^e	136
	35.0	0	95
短光照 (9:15)	17.5	9.04 ± 0.87 ^a	88
	20.0	8.20 ± 1.15 ^b	85
	25.0	4.11 ± 0.50 ^c	108
	30.0	3.04 ± 0.55 ^d	120
	35.0	0	92

注: 同列数据(平均数 ± 标准误)后标有不同字母表示差异有统计学意义; 下同

Notes: The different letters in the same column indicate there is a significant difference; the same below

不显著负相关($R^2 = -0.110$, $P = 0.814$);在固定光照条件下,温度与幼虫的发育历期呈显著负相关($R^2 = -0.847$, $P = 0.016$)。

2.3 温度和光周期对蛹发育历期的影响

不同温度条件下,长光照组虎斑蝶蛹的发育历期为 6~28 d,短光照组为 5~24 d(表 3)。在相同光照和设定温度范围内,随着温度上升,蛹的发育加快,发育历期缩短。方差分析表明,无论是在长光照还是短光照条件下,不同温度条件下蛹的发育历期差异均有高度统计学意义($P < 0.01$)。偏相关分析表明,在固定温度条件下,光照与蛹的发育历期呈不显著负相关($R^2 = -0.005$, $P = 0.991$);在固定光照条件下,温度与蛹的发育历期呈极显著负相关($R^2 = -0.911$, $P = 0.004$)。

2.4 温度和光周期对整个幼期发育历期的影响

不同温度条件下,长光照组虎斑蝶从卵到成虫羽化整个幼期的发育历期为 18~82 d,短光照组为 17~70 d(表 4)。在相同光照和设定温度范围内,随着温度上升,幼期的生长发育加快,发育历期缩短。偏相关分析表明,在固定温度条件下,光照与幼期的发育历期呈不显著负相关($R^2 = -0.018$, $P = 0.969$);在固定光照条件下,温度与幼期的发育历期呈极显著负相关($R^2 = -0.885$, $P = 0.008$)。

表2 不同温度和光周期下虎斑蝶幼虫的发育历期

Table 2 Developmental durations of the larvae of *Danaus genutia* under different temperatures and photoperiods

光周期 Photoperiod	温度 Temperature/°C	发育历期 Developmental duration/d					
		1 龄幼虫 1st instar	2 龄幼虫 2nd instar	3 龄幼虫 3rd instar	4 龄幼虫 4th instar	5 龄幼虫 5th instar	幼虫全期 1st - 5th instar
长光照 (15:9)	17.5	7.29 ± 1.27 ^a (72)	6.17 ± 0.96 ^a (49)	6.71 ± 1.40 ^a (38)	7.17 ± 1.49 ^a (37)	10.71 ± 1.73 ^a (30)	38.04 ± 3.65 ^a (30)
	20.0	3.83 ± 1.04 ^b (69)	2.90 ± 0.67 ^b (41)	2.83 ± 0.60 ^b (35)	3.31 ± 0.71 ^b (33)	5.03 ± 0.72 ^b (31)	17.89 ± 1.33 ^b (31)
	22.5	3.17 ± 0.78 ^c (52)	2.70 ± 0.63 ^b (47)	2.91 ± 0.60 ^b (39)	3.00 ± 0.52 ^b (32)	5.35 ± 0.81 ^b (30)	17.13 ± 1.50 ^b (30)
	25.0	1.91 ± 0.38 ^d (75)	1.70 ± 0.68 ^c (66)	1.58 ± 0.61 ^c (47)	2.03 ± 0.53 ^c (42)	3.60 ± 1.15 ^c (34)	10.82 ± 1.55 ^c (34)
	27.5	2.25 ± 0.61 ^d (76)	1.58 ± 0.50 ^c (42)	1.42 ± 0.50 ^c (27)	2.00 ± 0.72 ^c (26)	2.67 ± 0.48 ^d (23)	9.92 ± 0.88 ^c (23)
	30.0	2.33 ± 0.62 ^d (84)	1.67 ± 0.62 ^c (50)	1.33 ± 0.62 ^c (27)	1.73 ± 0.88 ^c (18)	3.13 ± 0.35 ^{cd} (15)	10.20 ± 1.57 ^c (15)
短光照 (9:15)	17.5	5.81 ± 1.06 ^a (76)	4.96 ± 1.22 ^a (54)	5.04 ± 1.22 ^a (34)	5.19 ± 1.10 ^a (30)	9.08 ± 0.99 ^a (30)	30.08 ± 2.96 ^a (30)
	20.0	5.07 ± 0.70 ^b (45)	2.93 ± 0.46 ^b (27)	2.67 ± 0.49 ^b (17)	2.80 ± 0.56 ^b (17)	5.07 ± 0.57 ^b (17)	18.54 ± 0.96 ^b (17)
	25.0	3.21 ± 0.74 ^c (71)	1.89 ± 0.63 ^c (53)	1.96 ± 0.58 ^c (31)	2.32 ± 0.67 ^b (28)	3.90 ± 0.32 ^c (28)	13.29 ± 1.08 ^c (28)
	30.0	2.29 ± 0.62 ^d (77)	1.38 ± 0.58 ^d (43)	1.38 ± 0.58 ^d (33)	1.50 ± 0.59 ^c (22)	3.00 ± 0.20 ^d (22)	9.54 ± 1.10 ^d (22)

注 Note: 括号内数字为样本量 Number in the bracket is the sample size

表3 不同温度和光周期下虎斑蝶蛹的发育历期

Table 3 Developmental durations of the pupae of *Danaus genutia* under different temperatures and photoperiods

光周期 Photoperiod	温度 Temperature/°C	发育历期 Developmental duration/d	样本量 Sample size
长光照 (15:9)	17.5	22.71 ± 2.35 ^a	29
	20.0	13.72 ± 1.00 ^b	30
	22.5	12.00 ± 0.80 ^c	29
	25.0	7.73 ± 0.45 ^d	34
	27.5	7.46 ± 0.59 ^{de}	23
	30.0	6.80 ± 0.56 ^e	15
短光照 (9:15)	17.5	21.19 ± 1.86 ^a	29
	20.0	13.40 ± 0.51 ^b	17
	25.0	9.64 ± 0.56 ^c	28
	30.0	6.38 ± 0.58 ^d	22

2.5 幼期各虫态发育起点温度和有效积温

虎斑蝶完成整个幼期发育需要的有效积温为 $286.28 \text{ d} \cdot ^\circ\text{C} \pm 33.62 \text{ d} \cdot ^\circ\text{C}$ 。其中, 卵的发育起点温度和有效积温最低, 分别为 $11.10 \text{ }^\circ\text{C} \pm 1.56 \text{ }^\circ\text{C}$ 和 $55.15 \text{ d} \cdot ^\circ\text{C} \pm 6.68 \text{ d} \cdot ^\circ\text{C}$; 其次是蛹, 分别为 $13.46 \text{ }^\circ\text{C} \pm 1.01 \text{ }^\circ\text{C}$ 和 $98.95 \text{ d} \cdot ^\circ\text{C} \pm 9.27 \text{ d} \cdot ^\circ\text{C}$;

表4 不同温度和光周期下虎斑蝶幼期的发育历期

Table 4 Developmental durations of the immature stages of *Danaus genutia* under different temperatures and photoperiods

光周期 Photoperiod	温度 Temperature/°C	发育历期 Developmental duration/d	样本量 Sample size
长光照 (15:9)	17.5	70.04 ± 3.69 ^a	30
	20.0	36.52 ± 1.79 ^b	31
	22.5	34.04 ± 1.64 ^c	30
	25.0	22.52 ± 1.68 ^d	34
	27.5	20.92 ± 1.50 ^e	23
	30.0	20.20 ± 2.21 ^e	15
短光照 (9:15)	17.5	60.31 ± 3.95 ^a	29
	20.0	40.13 ± 1.73 ^b	17
	25.0	27.04 ± 1.43 ^c	28
	30.0	18.96 ± 1.33 ^d	22

幼虫的最高, 分别为 $14.06 \text{ }^\circ\text{C} \pm 1.58 \text{ }^\circ\text{C}$ 和 $131.62 \text{ d} \cdot ^\circ\text{C} \pm 20.49 \text{ d} \cdot ^\circ\text{C}$, 其有效积温约占幼期各虫态积温总和的 45%。幼虫不同龄期的发育起点温度由大到小依次是: 3 龄 > 5 龄 > 1 龄 > 2 龄 > 4 龄; 幼虫在不同龄期的有效积温由大到小依次是: 5 龄 > 1 龄 > 4 龄 > 2 龄 > 3 龄(表 5)。

表 5 长光照下虎斑蝶幼期各虫态发育起点温度和有效积温
Table 5 Developmental threshold temperatures and effective accumulated temperatures of the immature stages of *Danaus genutia* under long-day treatment

虫期 Developmental stage	发育起点温度 Developmental threshold temperature/℃	有效积温 Effective accumulated temperature/(d·℃)	发育历期的预测式 Forecast formula of developmental duration
卵	11.01 ± 1.56	55.15 ± 6.68	$N = \frac{55.15 \pm 6.68}{T - (11.01 \pm 1.56)}$
1 龄幼虫	14.51 ± 2.60	25.65 ± 6.68	$N = \frac{25.65 \pm 6.68}{T - (14.51 \pm 2.60)}$
2 龄幼虫	14.18 ± 1.72	20.82 ± 3.57	$N = \frac{20.82 \pm 3.57}{T - (14.18 \pm 1.72)}$
3 龄幼虫	15.45 ± 1.13	16.53 ± 2.11	$N = \frac{16.53 \pm 2.11}{T - (15.45 \pm 1.13)}$
4 龄幼虫	13.75 ± 0.87	25.02 ± 2.08	$N = \frac{25.02 \pm 2.08}{T - (13.75 \pm 0.87)}$
5 龄幼虫	14.65 ± 2.19	36.72 ± 8.47	$N = \frac{36.72 \pm 8.47}{T - (14.65 \pm 2.19)}$
幼虫全期	14.06 ± 1.58	131.62 ± 20.49	$N = \frac{131.62 \pm 20.49}{T - (14.06 \pm 1.58)}$
蛹	13.46 ± 1.01	98.95 ± 9.27	$N = \frac{98.95 \pm 9.27}{T - (13.46 \pm 1.01)}$
卵~成虫羽化	13.38 ± 1.27	286.28 ± 33.62	$N = \frac{286.28 \pm 33.62}{T - (13.38 \pm 1.27)}$

3 讨论

本研究初步探讨了温度和光周期对虎斑蝶幼期虫态发育的影响,基本确定了其适宜温度范围,为该重要观赏蝶种的人工繁育提供了重要参数。结果表明,在 17.5~30.0 ℃内,虎斑蝶卵、幼虫和蛹均能正常发育;随着温度上升,各虫态的生长发育加快,发育历期显著缩短;当温度为 15 ℃ 和 35 ℃ 时,卵均不能孵化;温度是影响幼期发育速率的主导因素。温度不仅影响发育速率,也影响幼虫成活率。初步观察表明,在 17.5 ℃ 和 30.0 ℃ 下,虎斑蝶幼虫的存活率较 20.0~27.5 ℃ 下明显降低(陈祯,2010)。Goehring 和 Oberhauser(2002)认为,30 ℃ 以上的高温对君主斑蝶 *Danaus plexippus* 幼虫可能有亚致死作用,并大幅延长了其发育历期。吕龙石等(2004)对麝凤蝶 *Byasa alcinous* 的研究表明,30 ℃ 以上的温度不利于幼虫的生长与化蛹,34 ℃ 已经超出卵孵化与越冬蛹羽化的上限温度。

本研究中,光照与虎斑蝶幼期各虫态的发育历期相关性均不显著。但 Goehring 和 Oberhauser(2002)发现,较短及渐短的光照都能加快君主斑蝶幼期发育,并诱发其成虫进入生殖休眠。这种差异可能是 2 个物种间的光周期反应性不同所致,也可

能与本研究中光周期设置较少有关。在其他蝶类中,易传辉等(2007)发现凤蝶科 Papilionidae 美凤蝶 *Papilio memnon* 在 12~15 h 光照内,幼虫最长和最短发育历期相差 9.2 d,25 ℃ 时相差达 10.6 d,差异十分显著。与此类似,光周期对凤蝶科柑橘凤蝶 *Papilio xuthus* 幼期生长发育也有明显影响,不同光周期下幼虫发育历期、幼虫化蛹的发育历期都存在明显差异(易传辉等,2009)。而 Yoshio 和 Ishii(2004)的结果表明,光周期对马来西亚沙巴美凤蝶幼虫发育历期的影响并不明显。这些差别可能是同一物种不同地理种群间的遗传差异所致。

本研究还计算了幼期各虫态的发育起点温度和有效积温。在虎斑蝶幼期虫态中,卵的发育起点温度最低(11.10 ℃ ± 1.56 ℃),这在我国绝大多数地方的晚春至初秋都能满足。整个幼期发育需要的有效积温为 286.28 d·℃ ± 33.62 d·℃,据此初步估算在我国南方低海拔地区可年养殖 5 代以上,而在热带和部分南亚热河谷,年养殖更可高达 10 代以上。这种生物学特性赋予了虎斑蝶巨大的养殖利用潜力。在养殖生产上,建议将幼期养殖温度控制在 20.0~27.5 ℃,同时可调整养殖温度以适时满足市场对活体成虫的需要。光照并非养殖生产中需要重点管理的条件,采用自然光照即可。

在蝴蝶的人工繁育中,温度是关键的技术指标之一,但相关研究并不多见,且主要集中在凤蝶科和蛱蝶科蛱蝶亚科种类中(易传辉等,2007,2009)。斑蝶亚科 Nymphalinae 的大多数种类色彩艳丽、飞行缓慢,是当前国内蝴蝶生态观赏园中的主流蝶种。这类蝴蝶年世代数多、繁殖力强,极具开发利用潜力。有关这个重要蝴蝶类群的生理生态研究国外已有一些报道(Malcolm *et al.*, 1987; Goehring & Oberhauser, 2002),国内这方面的研究工作还需要进一步加强。

致谢:西南林业大学保护生物学学院曹永同学和蒋创同学参与了部分实验观察,昆明中林观赏昆虫科技开发有限公司赵灿繁协助采集实验虎斑蝶种源。在此一并致谢!

参考文献:

- 陈晓鸣,周成理,史军义,等. 2008. 中国观赏蝴蝶[M]. 北京:中国林业出版社: 207-209.
- 陈祯,曹永,周元清,等. 2017. 虎斑蝶实验种群生物学特征研究[J]. 应用昆虫学报, 54(2): 279-291.
- 陈祯. 2010. 虎斑蝶生理生态学研究[D]. 昆明:西南林业大学.
- 吕龙石,金大勇,朴锦. 2004. 温度和光周期对麝凤蝶生长发育的影响[J]. 昆虫知识, 41(6): 572-574.
- 易传辉,陈晓鸣,史军义,等. 2007. 光周期和温度对美凤蝶幼虫发育历期的影响[J]. 林业科学, 20(4): 547-550.
- 易传辉,陈晓鸣,史军义,等. 2009. 光周期对柑橘凤蝶幼虫生长发育及存活的影响[J]. 西北农业学报, 18(1): 162-164, 169.
- 张孝羲. 2011. 昆虫生态及预测预报(第三版)[M]. 北京: 中国农业出版社: 35-36.
- 周尧. 1998. 中国蝶类志(修订版)[M]. 郑州: 河南科学技术出版社: 382-383.
- Atluri JB, Rayalu MB, Deepika DS. 2010. Life history and larval performance of the common tiger butterfly, *Danaus genutia* Cramer (Lepidoptera; Rhopalocera; Danaidae) [J]. The Bioscan, 5(3): 511-515.
- Bhuyan M, Kataki D, Deka M, *et al.* 1999. Nectar host plant selection and floral probing by the India butterfly *Danaus genutia* (Nymphalidae) [J]. Journal of Research on the Lepidoptera, 38(1): 79-84.
- Goehring L, Oberhauser KS. 2002. Effects of photoperiod, temperature, and host plant age on induction of reproductive diapause and development time in *Danaus plexippus* [J]. Ecological Entomology, 27(6): 674-685.
- Igarashi S, Fukuda H. 2000. The life histories of Asian butterflies [M]. Tokyo: Tokai University Press: 244-245.
- Malcolm SB, Cockrell BJ, Brower LP. 1987. Monarch butterfly voltinism: effects of temperature constraints at different latitudes [J]. Oikos, 49: 77-82.
- Meyer CE. 1995. Notes on the life history of *Danaus genutia alexis* (Waterhouse and Lyell) (Lepidoptera: Nymphalidae) [J]. Australian Entomologist, 22(4): 137-139.
- Robinson GS, Ackery PR, Kitching IJ, *et al.* 2001. Hostplants of the moth and butterfly caterpillars of the Oriental Region [M]. London: The Natural History Museum.
- Yoshio M, Ishii M. 2004. Photoperiod effects on pupal development in two tropical *Papilio* butterflies (Lepidoptera, Papilionidae) [J]. Transactions of the Lepidopterological Society of Japan, 55(4): 275-279.